

- 2.** Чоловік 38-ми років вживає алкоголь впродовж 3-х років. Через 3 дні після запою став відчувати тривогу, страх. Бачив навколо себе павуків, черв'яків, стали переслідувати "голоси" осудливого характеру. Поводив себе агресивно. У власній особі орієнтований вірно, в місці та часі – дезорієнтований. Який найбільш імовірний діагноз?
- A.** Алкогольний делірій
  - B.** Алкогольний параноїд
  - C.** Алкогольний галюциноз
  - D.** Алкогольна енцефалопатія
  - E.** Патологічне сп'яніння
- 3.** Хворий 47-ми років скаржиться на безсоння, важкість в усьому тілі, постійно пригнічений настрій. Вважає себе нікчемним, неспроможним. Гадає, що є тягарем для своїх рідних, воліє померти. Пригнічений, малорухливий, обличчя гіпомімічне, скорботне. Мова тиха, монотонна, відповіді короткі. Який діагноз найбільш імовірний?
- A.** Великий депресивний розлад
  - B.** Атеросклеротична депресія
  - C.** Початкова стадія хвороби Альцгеймера
  - D.** Шизофренія з пізнім дебютом
  - E.** Невротична депресія
- 4.** Чоловік 43-х років, який має контакт із етилованим бензином, надійшов до клініки зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, погіршення пам'яті, сонливість вдень та безсоння вночі, відчуття "волосся" в роті, колькоподібний біль у правому підребер'ї. Який найбільш імовірний діагноз?
- A.** Хронічна інтоксикація тетраетилсвинцем
  - B.** Алкогольний делірій
  - C.** Хронічна інтоксикація ртуттю
  - D.** Хронічна інтоксикація марганцем
  - E.** Хронічна інтоксикація свинцем
- 5.** Хворий 30-ти років, теся. Півроку тому стали проявлятися зміни у поведінці: виник інтерес до філософії, почав писати трактат про мету свого людського існування, залишив свою основну роботу, перестав піклуватися про дітей, виходив на вулицю неохайно одягненим, чув "у голові голоси", які керують його поведінкою. Впевнений, що він - посол від Бога Землі і постійно відчуває на собі його вплив. До хвороби не критичний. Який діагноз можна припустити у хворого?
- A.** Шизофренія
  - B.** Алкогольний психоз
  - C.** Реактивний психоз
  - D.** Соматогенний психоз
  - E.** Органічний психоз
- 6.** У чоловіка 45-ти років протягом останніх двох тижнів з'явилася підвищена активність, став багатомовним, ейфорійним, мало спав, заявляв, що може "врятувати людство", здатен вирішити проблему рака та СНІДу, роздавав гроші незнайомцям. Який найбільш імовірний діагноз?
- A.** Маніакальний напад
  - B.** Панічний розлад

- C. Ажитована депресія
- D. Шизоафективний розлад
- E. Кататонічне збудження

7. У хлопчика 10-ти років періодично виникають короткочасні стани (до 10-15 секунд) у вигляді "раптового відключення", які супроводжуються зупинкою і фіксацією погляду у прямому положенні, відсутнім беззмістовним виразом обличчя, зупинкою рухів та наступною амнезією. Який найбільш імовірний стан описано?

- A. Абсанс
- B. Обнубіляція
- C. Транс
- D. Фуга
- E. Шперрунг

8. Жінка 46-ти років вперше доставлена до психіатричного стаціонару у зв'язку з суїцидальною спробою. Зі слів родичів: стала подавленою, висловлювала думку, що марно прожила життя. Під час бесіди з лікарем напружена, настрої знижений, песимістично оцінює свій стан та майбутнє. Суїцидальну спробу заперечує, відмовляється від госпіталізації, наполягає, щоб її відпустили додому. Яка тактика щодо цієї хворої?

- A. Невідкладна госпіталізація до стаціонару
- B. Взяти письмову відмову
- C. Направити до денного стаціонару
- D. Провести психотерапевтичну бесіду
- E. Направити на амбулаторне лікування

9. Жінка 20-ти років скаржиться на біль, неприємне тяжке відчуття у ділянці серця, часте серцебиття. ЕКГ – без патології. Седативні ліки зняли біль, але залишилась тривога, впевненість у важкому серцевому захворюванні, страх смерті, очікування нового нападу і страх перед ним. Який провідний психопатологічний синдром?

- A. Кардіофобічний
- B. Іпохондричний
- C. Обсесивний
- D. Істеричний
- E. Депресивний

10. У пацієнтки сумний вираз обличчя, уповільнене мислення. Відмічає пригнічений настрій, зниження працездатності, апетиту. Переважають думки про власну неповноцінність, безнадійність своєї життєвої ситуації та песимістичні прогнози на майбутнє. Визначте психічний розлад:

- A. Депресія
- B. Апатія
- C. Астенія
- D. Дисфорія
- E. Амнезія

11. Чоловік 27-ми років виглядає старшим за свій вік, дратівливий, довгий час "нюхає порошок", після чого настає стан ейфорії з відчуттям підйому сил, активності, прискорення плину думок, з'являється балакучість, прагнення до діяльності, рухове збудження, з відчуттям легкості у всьому тілі. Який діагноз найбільш імовірний у даному випадку?

- A. Кокаїноманія
- B. Морфінізм
- C. Гашишоманія
- D. Барбітуроманія
- E. Нікотиноманія

**12.** Хворий 39-ти років три дні тому був прооперований з приводу гострого апендициту. Післяопераційний період без ускладнень, відзначено деяку подразливість, неспокійний сон. Ввечері на третю добу після операції став неспокійним, метушливим, чув, як на вулиці співають дівчата. Відганяв від себе "білих мух", кричав, що в кімнаті повно пацюків. Вважає, що він у себе вдома, в часі дезорієнтований. Соматично: гіпергідроз, АТ-160/100 мм рт.ст., температура тіла - 37, 4°C, тахікардія. Зі слів родичів багато років зловживає спиртним. Діагностуйте психічний розлад хворого:

- A. Алкогольний делірій
- B. Токсико-інфекційний психоз
- C. Гіпертоксична шизофренія
- D. Гострий шизо-афективний психоз
- E. Синдром Ганзера

**13.** У 13-річного хлопчика раптово виникли втрата свідомості, генералізовані клоніко-тонічні судоми. Об'єктивно: зіниці розширені, фотореакція відсутня, виражений ціаноз обличчя, прикушування язика, виділення білої піни з рота, мимовільне сечовипускання і дефекація. З анамнезу відомо, що дані напади відбуваються з трирічного віку декілька разів на рік, дитина постійно приймає седативні та протисудомні препарати. Бригадою швидкої медичної допомоги діагностований епілептичний статус. Оберіть препарат для купірування нападу:

- A. Діазепам
- B. Корглікон
- C. Атропін
- D. Аміназин
- E. Адреналін

**14.** Хворий 38-ми років поступив у наркологічне відділення із скаргами на безсоння, тривогу. Ввечері став неспокійним, зривався з ліжка, струшував з ковдри і одягу "павуків", скрізь бачив "здорових щурів і змій", відганяв неіснуючих мух. Вважає, що він дома, чує за вікном "голоси циган", хоче бігти, щоб їх "вигнати з городу". Соматичний стан: температура - 37, 8°C, виражений гіпергідроз, тремор усього тіла. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Алкогольний делірій
- B. Патологічне сп'яніння
- C. Алкогольний галюциноз
- D. Гострий алкогольний параноїд
- E. Істеричний сутінковий стан

**15.** Хвора 32-х років скаржиться на "душевний біль", поганий настрій, відсутність апетиту, безсоння. Вказані симптоми з'явилися поступово впродовж 3-х місяців без видимої причини. У психічному статусі: на питання відповідає тихим голосом, обличчя сумне, міміка скорботна, рухи уповільнені, емоційно пригнічена, темп мислення уповільнений. Стан хворої поліпшується ввечері і погіршується вранці. Який передбачуваний діагноз?

- A. Маніакально-депресивний психоз: депресивна фаза
- B. Реактивна депресія
- C. Циклотимія
- D. Депресивний синдром внаслідок органічного ураження центральної нервової системи
- E. Інволюційна меланхолія

16. Хвора 32-х років висловлює скарги на знижений настрій. Чує "голоси" сусідів, які їй загрожують, коментують її дії. Вважає, що вони стежать за нею через стіни, на вулиці, у магазині. Визначте синдром:

- A. Параноїдний
- B. Паранояльний
- C. Парафренний
- D. Депресивний
- E. Галюциноз

17. Хвора 30-ти років в психіатричному відділенні демонстративна, вередлива, балакуча, постійно привертає до себе увагу оточуючих. Скаржиться на болі у всьому тілі. Побачивши лікаря - стогне, хватається за голову, голосить, демонструє неможливість ходити, тримається за оточуючі предмети. Наодинці вільно ходить по палаті, співає, накладає макіяж. Визначте стан хворої:

- A. Істеричний невроз
- B. Невроз нав'язливих станів
- C. Іпохондричний розвиток особистості
- D. Шизофренія
- E. Маніакально-депресивний психоз

18. Громадянин зловживає спиртними напоями, пропиває майно і заробітну плату, чим ставить себе, свою дружину і двох неповнолітніх дітей у важке матеріальне становище. Був на обліку в наркологічному диспансері за місцем проживання. Дружина звернулася до свого сімейного лікаря за порадою, з якою заявою до суду вона має право звернутися?

- A. Про обмеження цивільної дієздатності чоловіка
- B. Про визнання чоловіка недієздатним
- C. Про визнання чоловіка частково дієздатним
- D. Про визнання чоловіка неправоздатним
- E. Про визнання чоловіка непрацездатним

19. Жінка 40-ка років з 15-ти років страждає на епілепсію з генералізованими епіпадами, які виникають 2-3 рази на місяць у нічний час та супроводжуються мимовільним сечовиділенням та дефекацією. Після психотравми (смерть батька) напади почастишали, виникають з періодичністю 2-3 хвилини, між нападами до свідомості не повертається, реакція зіниць на світло відсутня. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Епілептичний статус
- B. Істеричний напад
- C. Збільшення кількості великих епіпадів
- D. Абсанс
- E. Епілептичний психоз

**20.** Жінка 32-х років скаржиться на відчуття нереальності, змінності власного тіла. Коли стоїть перед дзеркалом, впізнає себе, але її руки, ноги, обличчя здаються їй чужими, що не належать їй. Який найбільш імовірний психопатологічний розлад у хворої?

- A.** Деперсоналізація
- B.** Дерезалізація
- C.** Галюцинації
- D.** Сенестопатії
- E.** Ілюзії

**21.** Зі слів хворого 38-ми років він чує голоси, які звучать в його голові. Його мовою хтось керує, він іноді говорить поза свою волю. Бачить події, які трапляються за межами кімнати, де знаходиться. Думки його течуть самі по собі, поза його бажанням, інколи навіть два потоки думок. Підозрює, що знаходиться під наглядом якоїсь наукової організації, яка ставить над ним експерименти. Це може бути:

- A.** Синдром Кандинського-Клерамбо
- B.** Синдром слухового галюцинозу
- C.** Психосенсорне порушення
- D.** Парафренний синдром
- E.** Параноїдний синдром

**22.** Хвора 37-ми років хворіє більше 10-ти років. Розповідає, що її мозком вже давно заволоділи "злочинні вчені-фізики", які випробовують на ній різні типи психотропної зброї. Відчуває на собі вплив лазерних променів, постійно чує повідомлення, які передаються їй безпосередньо в мозок. Емоційно монотонна, майже цілі дні проводить у ліжку, робить якісь записи, які нікому не показує. Свідомість ясна, формальних інтелектуально-мнестичних порушень не виявлено. Який діагноз у даної хворої?

- A.** Параноїдна шизофренія
- B.** Хронічний маячний розлад
- C.** Інволюційний параноїд
- D.** Шизо-афективний психоз
- E.** Реактивний параноїд

**23.** Хворий 19-ти років звернувся до терапевта зі скаргами на погане самопочуття, озноби, нежить, біль у м'язах та суглобах, ну доту та пронос. Просить виписати йому побільше знеболюючих та заспокійливих (трамадол або солпадеїн, котрі краще допомагають, та діазепам). Слизова зіву блідо-рожева, чиста. В легенях - везикулярне дихання. Тахікардія. Зіниці розширені, реакція на світло в'яла. На шкірі передпліч - сліди ін'єкцій. При обстеженні тримається розв'язно, роздратовано, грубий, брехливий. Встановіть діагноз:

- A.** Опійна наркоманія
- B.** Залежність від знеболюючих
- C.** Токсикоманія при зловживанні транквілізаторів
- D.** Гостре респіраторне захворювання
- E.** Харчова токсикоінфекція

**24.** У хворого 26-ти років за добу спостерігалось 4 генералізованих судомних напади, між якими хворий не приходив до ясної свідомості (перебуває в комі або сопорі). Визначте стан:

- A. Епілептичний статус
- B. Часті генералізовані судомні напади
- C. Часті джексоновські напади
- D. Істеричні напади
- E. Часті складні парціальні напади

**25.** Дівчинка 14-ти років з метою схуднути відмовлялася вживати їжу, інколи після їди викликала у себе блювання чи вживала проносне. Надмірно дратівлива, експлозивна, схильна до істеричних реакцій. Мають місце виражені шлунково-кишкові розлади, аменорея. Визначте психічний розлад:

- A. Психічна анорексія
- B. Істеричний невроз
- C. Соматизований розлад
- D. Дисфоричний розлад
- E. Психогенна депресія

**26.** Під час бесіди з лікарем хвора розповіла: "Кожну ніч при засинанні до мене приходить "вісник смерті", я проходжу повз неї та роблю вигляд, що її не бачу. Потім вона підкрадається до мого ліжка з сокирою: сокира виблискує, а її очі світяться люттям. Таке відбувається багато разів за ніч". Визначте стан хворого:

- A. Гіпнагогічні галюцинації
- B. Псевдогалюцинації
- C. Насильницьки спогади
- D. Ментизм
- E. Патологічний афект

**27.** Хворий 68-ми років, службовець. Близько двох років тому почалися порушення пам'яті: став забудькуватим в роботі і побуті, не справлявся із службовими обов'язками. Поступово став забувати імена рідних, назви предметів, став безпорадним, порушилася мова. Втратив навички письма, читання, догляду за собою. При комп'ютерно-томографічному дослідженні: атрофія кори великих півкуль мозку. Який діагноз є найбільш вірогідним?

- A. Хвороба Альцгеймера
- B. Хвороба Піка
- C. Атеросклеротична деменція
- D. Сенільна деменція
- E. Прогресивний параліч

**28.** Хворий 23-х років впродовж останніх 6-ти місяців став замкненим, уникав спілкування з оточуючими, усамітнювався, розмовляв сам з собою. При розмові з лікарем-психіатром спочатку приховував свої переживання, але потім розповів про особливі, нереальні голоси, що містяться в ньому самому ("гніздяться в мозку"). Які це розлади сприйняття?

- A. Псевдогалюцинації
- B. Ілюзії
- C. Галюцинації справжні
- D. Метаморфопсії
- E. Дерезалізація

**29.** Жінка 35-ти років скаржиться на біль у ділянці серця ("щемить, свердлить"), що виникає переважно у ранкові години в осінньо-весняний період, з іррадіацією болю в шию, спину, живіт; часте серцебиття, а також зниження загального життєвого тону. Виникнення цього стану не зв'язане з фізичним навантаженням. Увечері стан поліпшується. Соматичний, неврологічний статус та ЕКГ - без патології. Яка найбільш імовірна патологія зумовила таку клінічну картину?

- A.** Соматизована депресія
- B.** Стенокардія спокою
- C.** Неврозоподібна шизофренія
- D.** Нейроциркуляторна дистонія
- E.** Іпохондрична депресія

**30.** Чоловік 47-ми років страждає на рак легень в термінальній стадії. Розповідає, що протягом останніх 2-3-х тижнів помітив зміни в своєму психічному стані: бачить ввечері покійну матір, яка кличе до себе, відчуває запах сирієї землі, гнилого листа, бачить незнайомих людей, які несуть труну. При цьому відчуває страх. Які симптоми психічних розладів у хворого?

- A.** Справжні галюцинації
- B.** Ілюзорні розлади
- C.** Психосенсорні розлади
- D.** Маячні ідеї
- E.** Депресивні розлади

**31.** Хворий на алкоголізм заявляє, що "постійно чує за вікном чоловічі і жіночі голоси", які сперечаються між собою про нього: "одні називають його алкашем, придурком, якого треба зарізати або повішати, інші - добрим татом, тому що він приніс дитині яблуко". Про який психопатологічний синдром можна думати?

- A.** Галюцинаторний
- B.** Деліріозний
- C.** Параноїдний
- D.** Абстинентний
- E.** Онейроїдний

**32.** Хворий 37-ми років госпіталізований до реанімаційного відділення у зв'язку з повторюваними кожні півгодини судомними тоніко-клонічними нападами. Між нападами до свідомості не приходять. АТ- 120/90 мм рт.ст., Рс- 100/хв. Вчора ввечері був на весіллі, вживав алкоголь. 5 років тому переніс закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, після чого виникли поодинокі судомні напади з втратою свідомості. Хворий курс протиепілептичного лікування не проходив. Який препарат необхідно першочергово ввести для надання невідкладної допомоги?

- A.** Сибазон
- B.** Сульфат магнію
- C.** Оксипутират натрію
- D.** Аміназин
- E.** Тіопентал натрію

**33.** Хвора 20-ти років скаржиться на відчуття нестачі повітря, тривалі ниючі болі в ділянці серця, дратівливість. Під час обстеження: загальний стан задовільний, лабільність пульсу, АТ- 130/60 мм рт.ст. ЕКГ - порушення процесів реполяризації. У пацієнтки

діагностована нейроциркуляторна дистонія за кардіальним типом. Вкажіть умови, в яких хвора повинна отримувати лікування:

- A. Амбулаторне лікування
- B. Стаціонарне лікування в терапевтичному відділенні
- C. Стаціонарне лікування в кардіологічному відділенні
- D. Стаціонарне лікування в кардіохірургічному відділенні
- E. Стаціонарне лікування в психіатричному відділенні

34. В психічному статусі хворого 32-х років стійке патологічне зниження настрою. Контактний, коротко, але по суті відповідає на питання. Мовна продукція вкрай лаконічна, в уповільненому темпі. Рухи скуті та загальмовані. Висловлює ідеї самозвинувачення і самоприниження. Препарати якої групи в першу чергу показані хворому?

- A. Антидепресанти
- B. Анксіолітики
- C. Нейролептики
- D. Транквілізатори
- E. Нормотиміки

35. Хворий 19-ти років останні півроку був млявий, байдужий до себе та оточуючих. Почав погано вчитися, не засвоює матеріал, став пропускати заняття. Спілкується мало, замкнувся у собі, емоції невиразні. Більшу частину часу проводить у ліжку, неохайний, байдужий до зовнішнього вигляду, не миється, схильний до імпульсивних дій. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Проста шизофренія
- B. Кататонічна шизофренія
- C. Параноїдна шизофренія
- D. Резидуальна шизофренія
- E. Гебефренічна шизофренія

36. Хвора 19-ти років протягом десяти років страждає на епілептичну хворобу. Пішла на прийом до лікаря і не повернулася. Через три дні з'явилася додому обірваною, замерзлою. Поводила себе дивно: не розмовляла, ні з ким не спілкувалась, дивилася в одну точку, вночі не спала. Наступного дня стан нормалізувався. Хвора не змогла пригадати, що з нею відбувалося протягом останніх чотирьох діб. Оточуючим здавалася задумливою та сонною. Який психопатологічний синдром імовірно виник у хворой?

- A. Сутінковий розлад свідомості
- B. Оглушення
- C. Онейроїдний синдром
- D. Аментивний синдром
- E. Деліріозний синдром

37. Хворий 20-ти років доставлений бригадою швидкої медичної допомоги в коматозному стані. Зіниці різко звужені, ціаноз і сухість слизових оболонок, шкіра обличчя і тулуба бліда, волога і холодна. Пульс - 60/хв., артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., частота дихання - 8-10/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Отруєння опіатами
- B. Отруєння атропіном
- C. Отруєння барбітуратами
- D. Отруєння бензодіазепіновими похідними
- E. Отруєння сурогатами алкоголю



**38.** З дому надійшла дитина 3-х років, у якої на тлі гіпертермічного синдрому, спричиненого грипом, протягом 50-ти хвилин тривають тоніко-клонічні генералізовані судоми. Терапія не проводилася. Для негайного лікування судомного синдрому необхідно:

- A. Ввести діазепам
- B. Ввести кальцій
- C. Фізичні методи охолодження
- D. Фенобарбітал
- E. Жарознижувальні

**39.** У чоловіка 45-ти років протягом останніх двох тижнів розвинулася підвищена активність, став балакучим, ейфоричним, мало спав, стверджував, що може "врятувати людство", здатен вирішити проблему раку та СНІДу, роздавав гроші незнайомцям. Оберіть найбільш імовірний діагноз:

- A. Маніакальний напад
- B. Панічний розлад
- C. Ажитована депресія
- D. Шизоафективний розлад
- E. Кататонічне збудження

**40.** Хвора 32-х років скаржиться на "душевний біль", поганий настрій, відсутність апетиту, безсоння. Зазначені симптоми з'явилися поступово протягом 3-х місяців без видимої причини. У психічному статусі: на питання відповідає тихим голосом, обличчя сумне, міміка скорботна, рухи вповільнені, фон настрою знижений, емоційно пригнічена, темп мислення вповільнений. Стан хворої поліпшується ввечері й погіршується рано вранці. До якого спеціаліста необхідно направити хвору?

- A. Психіатра
- B. Невролога
- C. Ендокринолога
- D. Гастроентеролога
- E. Медичного психолога

**41.** Хвора 24-х років контактна, правильно орієнтована в місці, часі й власній особистості. Схвильована, не може всидіти на місці. Постійно говорить, що в її "теперішньому стані винуваті бабки", до яких вона ходила; що "голос у голові повторює, що я неправильно поводжуся, й постійно мучить мене". Увага звужена в обсязі, прикута до переживань. Критика до стану відсутня. Який з перерахованих препаратів можна призначити пацієнтці в якості основного?

- A. Галоперидол
- B. Іміпрамін
- C. Тразадон
- D. Бензобарбітал
- E. Препарати літію

**42.** Хворий 34-ти років перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні з приводу загострення шизофренії. Об'єктивно: перебуває в ліжку, рухливо загальмований, контакт відсутній. На запитання не відповідає. Поза одноманітна, пацієнт гіпомімічний, наявний симптом "хоботка", воскова гнучкість м'язів, симптом "повітряної подушки". В такому стані лишається близько тижня. Харчування парентеральне. Визначте наявний синдром розладу рухово-вольової сфери:

- A. Кататонічний ступор
- B. Депресивний ступор
- C. Психогенний ступор

D. Апатичний ступор

E. Екзогенний ступор

43. Рідні чоловіка 36-ти років звернулися до лікаря зі скаргами на зміни у його поведінці. Під час опитування чоловік повідомив, що чує голоси у своїй голові. Його мовою хтось керує та примушує говорити. Він зазначає, що бачить події, які трапляються за межами кімнати у якій він знаходиться. Думки його плинуть самі по собі, всупереч його бажанням. Інколи навіть два потоки думок одночасно. Під час подальшого опитування він повідомив лікаря, що має підозру щодо свого перебування під наглядом засекреченої наукової організації, яка ставить над ним експерименти. Який першочерговий висновок щодо стану пацієнта буде найбільш точним?

A. Синдром психічного автоматизму\*

B. Синдром слухового галюцинозу

C. Параноїдний синдром

D. Психосенсорний розлад

E. Парафренний синдром

44. Хворий 34-ти років перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні з приводу загострення шизофренії. Об'єктивно: перебуває в ліжку, рухливо загальмований, контакт відсутній. На запитання не відповідає. Поза одноманітна, пацієнт гіпомімічний, наявні симптом "хоботка", воскова гнучкість м'язів, симптом "повітряної подушки". В такому стані лишається близько тижня. Харчування парентеральне. Визначте наявний синдром розладу рухово-вольової сфери:

A. Кататонічний ступор\*

B. Депресивний ступор

C. Екзогенний ступор

D. Апатичний ступор

E. Психогенний ступор

45. Хвора 38-ми років, бухгалтер. На прийомі багато говорить, мова прискорена, швидко переключається з теми на тему, що робить розуміння мови хворої скрутним. Не може всидіти на стільці, жестикулює, несподівано починає співати, сміятися, декламувати вірші. Вважає себе "найздоровішою", "найщасливішою" заявляє, що "всі задрять її зовнішності та чудовому голосу". Зі слів родичів, останні 5 днів не спить вночі, відзначається підвищений апетит, гнівливість. З роки тому лікувалася у психіатра з приводу депресії. Який синдромальний діагноз є найбільш імовірним?

A. Маніакальний синдром\*

B. Депресивний синдром

C. Деліріозний синдром

D. Синдром гіперактивності з дефіцитом уваги

E. Шизофренія, параноїдна форма

46. Чоловік 78-ми років, правильно називає своє прізвище, ім'я, дату народження. Не може назвати поточну дату, свій вік, дезорієнтований у місці перебування. Не пам'ятає про смерть дружини, яка померла 5 років тому, а також нічого не може повідомити про останні роки свого життя. Мова уповільнена, словниковий запас обмежений, часто не може згадати назви предметів. У пробі на запам'ятовування десяти слів відтворює три слова. Прості арифметичні дії виконує з помилками. Не може пояснити сенсу поширених прислів'їв і приказок. Який синдромальний діагноз є найбільш імовірним?

A. Деменція\*

B. Галюцинаторний синдром

- C. Маячний синдром
- D. Депресивний синдром
- E. Маніакальний синдром

47. Жінка 35-ти років надійшла до відділення інтенсивної терапії з нападами судом з періодичністю 2-3 хвилини, між якими не відбувається покращення свідомості, реакція зіниць на світло відсутня. З дитинства хворіє на епілепсію. Зазвичай напади виникають 1-2 рази на місяць у нічний час та супроводжуються мимовільним сечовиділенням та дефекацією. Почастішання нападів та вищевказані ускладнення виникли на тлі перенесеного грипу. Який стан найбільш імовірно розвинувся у хворої?

- A. Епілептичний статус\*
- B. Епілептичний психоз
- C. Гіпокальціємічний криз
- D. Істеричний невроз

48. Чоловік 32-х років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на нав'язливі спогади про автомобільну аварію, яка була 3 місяці тому, порушення нічного сну, тривогу, зниження настрою і апетиту, загальну слабкість і спустошеність. Що найбільш доцільно призначити?

- A. Сертралін\*
- B. Амітриптилін
- C. Хлорпромазин
- D. Літію карбонат
- E. Карбамазепін

49. Хворий 25-ти років до психіатричної лікарні надходить вперше. Збуджений, говорить швидко й голосно, активно жестикулює. Без упину жартує, сміється, з обличчя не сходить посмішка. З лікарем розмовляє на "ти" пропонує йому зіграти в карти, залицяється до медсестер, запрошує їх на побачення. Розповідає, що останні 2 доби не спав, проте зовсім не відчуває втоми. Який препарат доцільно використати?

- A. Антипсихотичний\*
- B. Седативний
- C. Антидепресант
- D. Снодійний
- E. Ноотропний

50. Чоловік 27-ми років 3 роки тому переніс важку черепно-мозкову травму. Останній рік у нього з'явилися стани, коли він під час будь-якої роботи раптово застигає, не втрачаючи м'язового тону, вираз обличчя стає маскоподібним, що триває 1-2 хвилини. Після цього він повертається до попередньої діяльності, але подібні "відключення" не пам'ятає. Препарати якої групи доцільно призначити?

- A. Антikonвульсанти\*
- B. Антидепресанти
- C. Антипсихотики
- D. Антигіпертензивні засоби
- E. Ноотропні засоби

51. Пацієнтка, що 20 років страждає на параноїдну форму шизофренії, звернулася до дільничного психіатра зі скаргами на появу "голосів" у голові, що погрожують, лаються, безсоння, тривогу, думки, що "сусіди за нею стежать". Препарати якої групи доцільно призначити?

- A. Антипсихотичні засоби\*

- В. Антидепресанти
- С. Анксіолітики
- Д. Нормотиміки
- Е. Ноотропні засоби

52. Чоловік 38-ми років скаржиться на безсоння, пригнічений настрій, періодичну тривогу, жахливі сновидіння, в яких "бачить смерть своїх побратимів". Два місяці тому повернувся

з зони бойових дій. Який імовірний діагноз?

- А. Посттравматичний стресовий розлад\*
- В. Депресивний розлад
- С. Шизофренія
- Д. Обсесивно-компульсивний розлад
- Е. Біполярний афективний розлад

53. Жінка 78-ми років скаржиться доньці, що її сусідка систематично краде у неї консервацію з підвалу, намагається її отруїти, розкидаючи по городу "отруту". В якості "доказів" показує на добрива, що були раніше завезені сином хворої. Який психопатологічний синдром можна припустити?

- А. Паранояльний\*
- В. Галюцинаторний
- С. Деліріозний
- Д. Депресивний
- Е. Дементний

**PS. Правильна відповідь - А.**