

Тема 10

Порушення психологічного розвитку. Дитячий аутизм. Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці. Дитяча та підліткова шизофренія.

1. Дитина 3-х років з млявістю цілеспрямованої уваги, переважним розвитком механічної пам'яті, руховою розгальмованістю і збудливістю.

Визначити синдром.

- A. Органічний варіант раннього дитячого аутизму
- B. Синдром дисморфофобії
- C. Синдром гіпердинамічний
- D. Синдром гебоїдний
- E. Синдром маніакальний

2. Хлопчик 7-ми років знаходиться у психіатричній клініці з руховим неспокоєм, непосидючістю, імпульсивністю вчинків. Визначити синдром.

- A. Гіпердинамічний синдром
- B. Синдром раннього дитячого аутизму
- C. Синдром страхів
- D. Синдром патологічного фантазування

3. У хворого «папужна мова», рухова розгальмованість, розсіяність. Неврологічна симптоматика: ознаки гідроцефалії з епізодичними судомними нападами. Поставте діагноз.

- A. Гіпердинамічний синдром
- B. Синдром раннього дитячого аутизму
- C. Синдром страхів
- D. Синдром патологічного фантазування
- E. Синдром гебоїдний

4. Синдромом моторної розгальмованості називається:

- A. Гіпердинамічний
- B. Гіперреактивний
- C. Гіпермоторний
- D. Все вище перелічене
- E. Маніакальний

5. При віддалених наслідках ранніх органічних ураженнях головного мозку виникає:

- A. Синдром Аспергера
- B. Синдром Канера
- C. Синдром гіпердинамічний
- D. Синдром раннього дитячого аутизму
- E. Синдром страхів

6. Коли найчастіше проявляється гіпердинамічний синдром?

- A. 2-4
- B. 6-8

- C. 14-15
- D. 15-18
- E. 10-14

7. Гіпердинамічний синдром зустрічається при:

- A. Епілепсії
- B. Шизофренії
- C. Олігофренії
- D. Психопатії
- E. Всіх перелічених хворобах

8. Хто вперше описав синдром раннього дитячого аутизму?

- A. Канер
- B. Аспергер
- C. Ясперс
- D. Блейхер
- E. Корсаков

9. Синдром раннього дитячого аутизму проявляється :

- A. Емоційною холодністю
- B. Страхом
- C. Розладами мови
- D. Всім вище переліченим
- E. Галюцинаціями

10. Коли найчастіше проявляється синдром раннього аутизму?

- A. 1-3
- B. 2-4
- C. 5-6
- D. 8-10
- E. Все перелічене

11. Нормальний чи вищий за середній рівень інтелекту спостерігається при синдромі?

- A. Аспергера
- B. Канера
- C. Гебоїдному
- D. Корсаковському
- E. Все перелічене

12. Синдром Аспергера характеризується:

- A. IV рівнем інтелекту
- B. Випереджуючим розвитком мови
- C. Зустрічається виключно у хлопчиків
- D. Все вище перелічене

Е. Зустрічається виключно у дівчаток

13.Значна нестача чи повна відсутність у дітей потреби спілкування спостерігається при:

- А. Гіпердинамічному синдромі
- В. Синдромі раннього дитячого аутизму
- С. Синдромі страхів
- Д. Синдромі патологічного фантазування
- Е. Параноїчному синдромі