

Заняття 2

Порушення мислення та інтелекту. Порушення емоцій. Порушення ефекторної сфери.

1. Який психопатологічний розлад у хворого? Хворий багато років зловживає алкогольними напоями. Останнім часом, коли приходив додому у стані сп'яніння, приставав до дружини із звинуваченням у зраді йому, вимагав, щоб дружина сама у всьому зізналась, склав список чоловіків, які нібито є коханцями його дружини (у списку були й племінники). Говорив, що дружина з коханцями хоче його отруїти. Визначити психопатологічний стан.

- A. Деліріозний синдром
- B. Параноїдний синдром
- C. Галюцинаторно-параноїдний синдром
- D. Дементний синдром
- E. Парафренний синдром

2. Визначіть вид емоційного розладу, який найчастіше зустрічається при епілепсії і виявляється поєднанням тривоги, депресії та жаху. Виникає він періодично і йому властиві безпідставні або неадекватні реальній ситуації вияви пригніченого озлоблення, похмурої депресивності, бурхливого незадоволення, спалахи гніву, лютої агресивності та руйнівних дій.

- A. Дисфорія
- B. Гнівлива манія
- C. Дистимія
- D. Ажитована депресія
- E. Патологічний афект

3. Хвора 23 років під час прийому в лікаря заявляє: „Я не хочу жити! Даремно я розумію свої недоліки, якщо я не можу їх виправити. Не намагайтеся мене вилікувати, все одно я не зможу жити. Мені неймовірно важко, Ви цього не зрозумієте. Душа так болить, що сили жити більше немає”. Якою повинна бути тактика лікаря?

- A. Лікування в денному психіатричному стаціонарі
- B. Планова госпіталізація до психіатричної лікарні
- C. Невідкладна госпіталізація до психіатричної лікарні
- D. Роз'яснювальна бесіда, лікування у психіатра не потребує
- E. Лікування у дільничного психіатра

4. З наявністю гіпоманіакального стану можуть бути пов'язані наступні прояви, окрім:

- A. Підвищений апетит
- B. Порушення сну
- C. Розгальмованість потягів
- D. Посилення гемікранії
- E. Підвищення настрою

5. Маніакальне ідеаторне збудження може бути виражено наступними ознаками, окрім:

- A. Явища гіпермнезії
- B. Конфабуляції

- С. Прискорення асоціацій
- Д. Відсутність зосередженості зі стрибками ідей
- Е. Ідеаторна сплутаність

6. При маніакальному синдромі спостерігаються всі симптоми, окрім:

- А. Хаотичні безглузді рухи
- В. Підвищена відволікаємість
- С. Прагнення до спілкування, альтруїзм
- Д. Підвищення апетиту, гіперсексуальність
- Е. Переоцінка своїх можливостей, здібностей

7. При депресивному синдромі спостерігаються всі симптоми, окрім:

- А. Моторна загальмованість
- В. Сповільнений перебіг уявлень
- С. Зниження рівня свідомості, сомноленція
- Д. Суїцидальні думки і тенденції

8. Який синдром є незворотнім?

- А аментивний
- Б амнестичний
- В деменція
- Г астеничний

9. Етіологічні фактори олігофренії залежно від часу впливу поділяються

- А на спадкові
- Б на внутрішньоутробні
- В на перинатальні і перших 3 років життя
- Г все перераховане невірно

10. Характерними клінічними проявами дебільності є

- А слабкість абстрактного мислення
- Б афективна нестійкість
- В невміння використовувати знання для вирішення практичних завдань
- Г слабкість вольових функцій
- Д все перераховане невірно

11. Психози у хворих олігофренією розвиваються

- А у всіх випадках
- Б в більшій частині випадків
- В рідко, при наявності додаткових провокуючих чинників

12. До цілей лікування хворих дебільністю відносяться

- А навчання в обсязі програми початкової школи
- Б відновлення інтелекту
- В виховання
- Г-нічого з перерахованого

13. З перерахованих форм олігофренії можна попередити розвиток хвороби своєчасним лікуванням новонародженого

- А при хворобі Дауна
- Б при фенілкетонурії

- В при важкій вродженій гідроцефалії
- Г при синдромі Мартіна - Белла

14. Вкажіть найбільш часту причину затримки психічного розвитку

- А спадковість
- Б соціальна занедбаність
- В родові травми
- Г інфекції

15. Вроджене слабоумство (олігофренія) проявляється

- А дебільністю
- Б деменцією
- В імбецильністю
- Г ідіотією
- Д обсесями

16. Олігофренії обумовлені патологією мозку у зв'язку

- А з перинатальними шкідливостями
- Б з травмами в пологах
- В наркоманіями
- Г з шкідливостями перших трьох років життя
- Д ні з чим з перерахованого

17. Максимальна задача в реабілітації хворих на ідіотію полягає в навчанні

- А абетці
- Б простим арифметичним діям
- В навичкам самообслуговування
- Г елементарній професії

18. Для хвороби Дауна характерно все перераховане, крім

- А розвитку хвороби у жінок
- Б розвитку хвороби у чоловіків
- В збереження репродуктивних функцій
- Г розумової відсталості в ступені імбецильності у більшості хворих

19. Для якого синдрому характерна тріада Протопопова?

- А парафренного
- Б параноїдного
- В аментивного
- Г депресивного

20. Що з числа нижеперерахованого найбільш характерно для соматогенної депресії?

- А добові коливання настрою
- Б вітальне зниження настрою
- В обтяження соматичного стану
- Г скорботна нечутливість
- Д маячні ідеї провинності

21. Виділіть із запропонованих симптомів найбільш характерні соматичні ознаки депресії

- А втрата у вазі
- Б тахікардія
- В запори
- Г брадикардія

Д- порушення дихання
Е аменорея

22. Вкажіть характеристики астеничного синдрому

А емоційна лабільність
Б підвищена стомлюваність
В гіперестезія
Г оглушення
Д галюцинації

23. Іпохондричний синдром може включати в себе

А надмірно перебільшену увагу до здоров'я
Б фобію захворіти невиліковною хворобою
В маревну переконаність у неіснуючій хворобі
Г анозогностичний тип переживання хвороби

24. Для маніакально-депресивного психозу характерно

А збереження працездатності в міжприступному періоді
Б тенденція до рецидивів афективних нападів
В можливість переходу однієї фази в іншу без світлого проміжку
Г формування апатико - абулічного синдрому
Д виникнення депресивної симптоматики у відповідь на психотравми

25. Факторами ризику суїцидальної поведінки можуть бути

А депресивні стани
Б імперативні галюцинації
В маячні ідеї провинності
Г маячні ідеї любовного змісту

26. Імовірність суїцидальної поведінки у психічно хворих може зростати у випадку

А думок про безцільність існування
Б думок про безпросвітність майбутнього
В ідей малоцінності
Г ні в чому з перерахованого

27. При якому синдромі зустрічається наступна тріада симптомів: підвищений, радісний настрій, прискорене мислення, підвищена рухова активність?

А парафренний
Б депресивний
В іпохондричний
Г маніакальний
Д паранояльний

28. При якому синдромі зустрічається наступна тріада симптомів: тужливо-сумний настрій, сповільнене мислення, рухова загальмованість?

А маніакальному
Б кататонічному
В паранояльному
Г депресивному

29. Для якого синдрому характерне пароксизмальне виникнення тужливо-злісного настрою з схильністю до агресивних дій?

А депресивного

- Б обсессивного
- В деліріозного
- Г дисфорічного
- Д для всіх зазначених синдромів

30. Вкажіть правильні твердження щодо маячних ідей при маніакально-депресивному психозі?

- А характерні маячні ідеї переслідування
- Б марення носить первинний характер
- В маячні ідеї відповідають вираженості афекту
- Г марення носить вторинний характер

31. До якої групи синдромів відноситься дисфорія?

- А маревних
- Б синдромів порушення свідомості
- В афективних
- Г кататонічних

32. Який з нижчеперерахованих ознак, симптомів є характерним, що відрізняє масковані депресії від інших депресій?

- А маячні ідеї самознищення і самозвинувачення
- Б нав'язливі страхи
- В добові коливання настрою
- Г переважання соматичних скарг
- Д суїцидальні думки

33. Якому з числа нижчеперелічених описів, визначень відповідає поняття маскованих депресії?

- А виражений афективний компонент депресивної тріади. Ідеаторний компонент виражений слабо. Рухова загальмованість відсутня.
- Б є виражена рухова і психічна загальмованість. Афективний компонент виражений слабо.
- В рухова і психічна загальмованість НЕ виражені. Депресивний афект виражений слабо.
- Його місце займають соматичні скарги.

34. Класична маніакальна тріада включає в себе:

- А підвищений настрій
- Б прискорення асоціацій
- В рухове збудження
- Г марення величі
- Д розгальмування потягів

35. Для депресивного синдрому характерні:

- А переживання туги
- Б рухова загальмованість
- В псевдогалюцинації
- Г ідеаторна загальмованість
- Д маячні ідеї самозвинувачення

36. Що може служити критерієм відмінності кататонічного ступору від депресивного?

- А ступінь вираженості
- Б тривалість
- В негативізм, підвищення м'язового тону

Г відмова від їжі

37. Вкажіть сукупність ознак, які відповідають твердженню: "для кататонічного порушення характерно"

- А- постійне прагнення до діяльності, підвищене відволікання, цілеспрямованість дій
- Б стереотипія, імпульсивність, неприродність рухів, ехолалія, ехопраксія
- В злобно-гужливий настрій, звужене свідомість, страхітливі галюцинації, марення переслідування
- Г ажитація, суїцидальна поведінку

38. Кататонічне збудження становить небезпеку агресії

- А для певних осіб
- Б для випадкових осіб
- В для самого хворого
- Г для медперсоналу

39. Гіпербулія проявляється всім перерахованим, крім

- А підвищення вольової активності, посилення спонукань
- Б підвищена діяльність
- В почуття зробленості
- Г- поривчастість, ініціативність
- Д- балакучість, рухливість

40. Який клінічний симптом не характерний для кататонічного синдрому?

- А симптом повітряної подушки
- Б каталепсія
- В мутизм
- Г дисфорія
- Д негативізм